

**Velikost:** 14–15 cm  
**Rozpětí křídel:** 23–27 cm  
**Hmotnost:** 14–19 g

### Rehek domácí

*Phoenicurus ochruros*  
Hausrotschwanz / Black Redstart



**Velikost:** 13–15 cm  
**Rozpětí křídel:** 21–24 cm  
**Hmotnost:** 12–20 g

### Rehek zahradní

*Phoenicurus phoenicurus*  
Gartenrotschwanz / Redstart



**Velikost:** 23 cm  
**Rozpětí křídel:** 33–36 cm  
**Hmotnost:** 65–90 g

### Drozd zpěvný


*Turdus philomelos*  
Singdrossel / Song Thrush



**Velikost:** 26 cm  
**Rozpětí křídel:** 39–42 cm  
**Hmotnost:** 80–140 g

### Drozd kvíčala


*Turdus pilaris*  
Wacholderdrossel / Fieldfare



**Velikost:** 14 cm  
**Rozpětí křídel:** 16–19 cm  
**Hmotnost:** 7–9 g

### Mlynařík dlouhoocasý

*Aegithalos caudatus*  
Schwanzmeise / Long-tailed Tit



**Velikost:** 24–25 cm  
**Rozpětí křídel:** 30–34 cm  
**Hmotnost:** 55–80 g

### Ťuhák šedý

*Lanius excubitor*  
Raubwürger / Great Grey Shrike



**Velikost:** 14–15 cm  
**Rozpětí křídel:** 24–26 cm  
**Hmotnost:** 17–30 g

### Hýl rudý

*Carpodacus erythrinus*  
Karmínčimpel / Rosefinch



**Velikost:** 18 cm  
**Rozpětí křídel:** 29–33 cm  
**Hmotnost:** 48–62 g

### Dlask tlustozubý

*Coccothraustes coccothraustes*  
Kernbeißer / Hawfinch

**Název:** Drozd kvíčala

**Třída:** ptáci

**Řád:** pěvci

**Čeleď:** drozdovití

**Délka života:** 9 let

**Popis:** Obě pohlaví jsou stejně zbarvena. Svrchní strana kostičce, spodní část zad a hlava mají šedou barvu. Horní část zad, křídla a ocas jsou tmavě hnědé. Spodina je světle okrová, hruď okrová s tmavými skvrnami. Na spodní straně křídel je za letu dobře vidět bílý přední okraj křídel.

**Hlas:** Vábení je charakteristické „šak šak“. Zpěvem je rychlá směs švitořivých, drncivých a hvízdavých tónů.

**Potrava:** Živí se žížalami, hmyzem, na podzim a v zimě bobulemi a jinými plody.

**Rozšíření:** Areál rozšíření pokrývá téměř celou Evropu a v Asii se vyskytuje až do střední Sibíře. Žije v různých typech lesa, v alejích, podél cest a na hřbitovech. Většina kvíčal je tažná, tahové chování závisí na množství dostupné potravy. Zimoviště kvíčal zaujímá celou Evropu a střední Rusko až po Altaj. Středoevropsští ptáci zimují převážně v západním Středomoří

**Hnízdění:** Hnízdí jedenkrát až dvakrát ročně. Často vytváří hnízdní kolonie na ochranu před dravci. Samice snáší 5–6 vajec a sedí na nich 12–14 dní. Mláďata hnízdo opouštějí po 12–15 dnech.

**Ilustrace:** Pavel Procházka

**Název:** Dlask tlustozobý

**Třída:** ptáci

**Řád:** pěvci

**Čeleď:** pěnkavovití

**Délka života:** 8 let

**Popis:** Robustní pták se zavalitým tělem, velkou hlavou a kuželovitým zobákem. Zbarvení je v různých odstínech hnědé, samec výrazněji, samice matněji. V letu je vidět výrazný bílý pruh v křídle a bílý konec ocasních per.

**Hlas:** Vábení je ostré „ciks“. Zpěv je nevýrazný a tichý.

**Potrava:** Je semenožravý. Rád požírá i dužnaté plody. Svým masivním zobákem rozlozskne i tvrdé pecky. Hmyzem krmí v omezené míře mláďata.

**Rozšíření:** Areál rozšíření je pruh táhnoucí se Eurasii až po Japonsko. V Evropě chybí v Irsku a v severní polovině Skandinávie a Ruska. Obývá starší listnaté nebo smíšené lesy. Můžeme ho potkat i v sadech a zahradách. Je částečně tažný. Nejčastěji přezimuje v Itálii, dále pak ve Francii a zemích bývalé Jugoslávie Část ptáků netáhne a zůstává blíže k hnízdišti. V zimě k nám často zalétávají dlastci ze severních oblastí.

**Hnízdění:** Hnízdí jedenkrát ročně v dubnu až červnu. Hnízda si staví na vysokých listnatých stromech. Samice snáší 4–6 vajec, na kterých sedí 11–14 dní. Po vylíhnutí krmí mláďata oba rodiče po dobu 10–14 dní.

**Ilustrace:** Pavel Procházka

**Název:** Drozd zpěvný

**Třída:** ptáci

**Řád:** pěvci

**Čeleď:** drozdovití

**Délka života:** 12 let

**Popis:** Obě pohlaví jsou stejně zbarvena, svrchu je olivově hnědý, hruď a břicho je světlé až bělavé, s tmavými hustými skvrnkami. Kratší ocas je zesponu tmavý a chybějí na něm bělavé skvrny.

**Hlas:** Vábi pronikavým „cik cik“ a často také tišším „ci ci“. Zpěv je individuálně variabilní, čisté flétnovité hvizdy a vrzavé i švitořivé tóny jsou pomlkami děleny do kratších trylků, které se opakují.

**Potrava:** Živí se žížalami, plži, hmyzem a koncem léta různými bobulemi.

**Rozšíření:** Areál rozšíření zaujímá téměř celou Evropu s výjimkou Středozeemí. V Asii je rozšířen až po jezero Bajkal. Žije v lesích a v roztroušené zeleni. Vidět ho můžeme také v parcích a zahradách. Naše populace je tažná, zimuje v jižní Evropě a severní Africe. V našich podmínkách se vyskytuje od března do října.

**Hnízdění:** Hnízdí dvakrát až třikrát do roka. Hnízdo si staví v keřích a na stromech, vnitřek je vymazán hlinou. Samice snáší 4–6 vajec a sedí na nich 12–13 dní. Mláďata opouštějí hnízdo po 8–12 dnech.

**Ilustrace:** Pavel Procházka

**Název:** Hýl rudý

**Třída:** ptáci

**Řád:** pěvci

**Čeleď:** pěnkavovití

**Délka života:** 7 let

**Popis:** Samec a samice jsou zbarvení rozdílné. Dospělý samec má karminově červenou hlavu, hruď a kostřec. Při zpěvu vysedává na vrcholcích stromů. Samice je nenápadně olivově zeleně zbarvená s šedou spodinou těla.

**Hlas:** Vábení je krátké, flétnovité a melancholické „gyi“ nebo „pyi“. Zpěv je tichý a pomalý složený z flétnovitých a vrzavých tónů.

**Potrava:** Živí se především semeny různých bylin a stromů. Mláďata krmí rodiče kaši z různých semen, kterou vyvrhují z volete.

**Rozšíření:** Areál jeho rozšíření je hlavně v Asii, zbytek především ve střední a severovýchodní Evropě. Obývá nivy vodních toků, mokřady a šíří se do blízkosti lidských sídel. Je tažný a zimuje v Indii. V našich podmínkách ho můžeme pozorovat od května do srpna.

**Hnízdění:** Hnízdí 1x ročně v nízkých keřích či vysokých bylinách. Samička snáší 3–6 vajíček, z nichž se po 11–12 dnech líhnou mláďata, která samice dlouho zahřívá a sameček ji po celou dobu krmí. Po dalších 9–12 dnech mláďata opouštějí hnízdo. O mláďata pečují oba rodiče, a to i po vyvedení z hnízda.

**Ilustrace:** Pavel Procházka

**Název:** Rehek zahradní

**Třída:** ptáci

**Řád:** pěvci

**Čeleď:** lejskovití

**Délka života:** 9 let

**Popis:** Ve zbarvení obou pohlaví jsou velké rozdíly. Samec má bílé čelo, hrdlo a boky hlavy jsou černé, hruď, břicho a ocas rezavě červené. Svrchní strana je šedá. Samice je hnědavá, se světle rezavou spodinou těla.

**Hlas:** Vábení je měkké „fuid tyk tyk nebo flétnové „fuid“. Zpěv je krátký a hlasitý s měkkými, vysokými a melancholickými strofy.

**Potrava:** Hlavní složku potravy tvoří hmyz, který sbírá v letu nebo na listech, dále se živí pavouky a koncem léta požírá bobule.

**Rozšíření:** Areál jeho rozšíření zaujímá téměř celou Evropu, Malou a západní Asii až po bajkalské jezero. Vyskytuje se také v severozápadní Africe. Obývá převážně listnaté a smíšené lesy, sady a zahrady. Nevystupuje až k horní hranici lesa jako rehek domácí. Zimuje v Arice, u nás se objevuje od dubna do září.

**Hnízdění:** Hnízdí dvakrát za hnízdní sezónu v dutinách stromů, obsazuje i vyvýšené budky. Samice snáší 5–7 vajec, na kterých sedí 12–14 dní. Mláďata opouštějí hnízdo ve stáří 14–15 dní.

**Ilustrace:** Pavel Procházka

**Název:** Ťuhýk šedý

**Třída:** ptáci

**Řád:** pěvci

**Čeleď:** ťuhýkovití

**Délka života:** 3 roky

**Popis:** Obě pohlaví jsou shodně zbarvena. Svrchu je šedý, spodina těla je čistě bílá. Typický je výrazný černý pásek přes oko.

**Hlas:** Vábení je typické „krriih“. Zpěv je málo výrazný těla a tichý.

**Potrava:** Živí se převážně velkým hmyzem, drobnými savci a ptáky. Přebytek potravy si napichuje na tmy keřů jako zásobu.

**Rozšíření:** Areál jeho rozšíření je téměř na všech kontinentech kromě Austrálie. V Evropě chybí na britských ostrovech, apeninském poloostrově a jihovýchodních částech kontinentu. Obývá otevřenou krajinu s roztroušenou vyšší zelení, paseky, okraje lesů i sady. Ptáci, kteří u nás hnízdí, přezimují nejčastěji v Itálii nebo na Balkáně. V zimě k nám přitahují ťuhýci šedí ze severu.

**Hnízdění:** Hnízdí jedenkrát ročně v dubnu až květnu. Hnízdo si staví na vysokých stromech. Samice snáší 4–7 vajíček a sedí na nich převážně sama 15–16 dní. Po vylíhnutí krmí mláďata oba rodiče, hnízdo opouštějí po 19–20 dnech. Rodiče pokračují v kmení i po vyvedení mláďat z hnízda.

**Ilustrace:** Pavel Procházka

**Název:** Rehek domácí

**Třída:** ptáci

**Řád:** pěvci

**Čeleď:** lejskovití

**Délka života:** 6 let

**Popis:** Jeho zbarvení se liší podle pohlaví. Samec je šedočerný, s bílou skvrnou v křídle a rezavým ocasem. Samice je světleji šedohnědá, bez bílé skvrny na křídle. Člověka často upoutá neustálým pohybem a ukláněním.

**Hlas:** Vábení je ostré „fit“ nebo „fit tek tek“. Zpěv je krátký, zaškracený, švitořivě vrzavý.

**Potrava:** Živí se hmyzem, pavouky a bobulemi.

**Rozšíření:** Obývá především jižní část Eurasie a severozápadní Afriku. Vyskytuje se kolem lidských sídel, spatří ho můžeme až nad horní hranici lesa. V našich podmínkách se zdržuje od jara až do listopadu, vzácně i zimuje.

**Hnízdění:** Hnízdí dvakrát ročně. Hnízda si staví na balvanitých svazích a skalních stěnách s roztroušenými keři. V lidských sídlech si často staví miskovitá hnízda na výstupcích staveb. Samička snáší 4–5 vajíček, na kterých sedí 13–14 dní. Mláďata jsou krmena oběma rodiči 12–17 dní v hnízdě a po vyvedení ještě 7–12 dní.

**Ilustrace:** Pavel Procházka

**Název:** Mlynařík dlouhoocasý

**Třída:** ptáci

**Řád:** pěvci

**Čeleď:** mlynaříkovití

**Délka života:** 5 let

**Popis:** Má drobné zavalité tělíčko s ocasem dlouhým až 10 cm. Zbarvení obou pohlaví je stejné. Hřbetem až na ocas se táhne černý pruh, lopatky jsou rudohnědé. Bělavá hruď přechází ve světle rudohnědé břicho. Ve střední Evropě se můžeme setkat s dvěma poddruhy. Středoevropský má na bocích hlavy nad okem tmavý pruh až na hřbet. Severoevropský má celou hlavu bílou. **Hlas:** Typickým zpěvem je „sirrrr“ nebo „sr sr“.

**Potrava:** Živí se výhradně živočišnou potravou, hlavně hmyzem a pavouky. Z hmyzu má nejraději vývojová stadia vajíček a larev, která často sezobává z tenkých větviček stromů.

**Rozšíření:** Areál rozšíření zaujímá Eurasii až po Ussurijskou oblast, na jih po Írán a jižní Čínu, v Evropě chybí pouze na severu Skandinávie a Ruska. Žije ve vlhkých a světlých lesích, kolem vodních toků, často v zahradách a parcích. Je stálý. V mimohnízdni době se potuluje v hejnech.

**Hnízdění:** Staví si vejčité hnízdo s bočním vletovým otvorem. Samička snáší 7–11 vajíček, na kterých sedí oba partneři, kteří se následně o potomstvo společně starají.

**Ilustrace:** Pavel Procházka