



Velikost: 40–51 cm,
z toho 20–30 cm ocas
Rozpětí křídel: 52–62 cm
Hmotnost: 160–310 g

Straka obecná

Pica pica
Elster / Magpie



Velikost: 32–35 cm
Rozpětí křídel: 49–53 cm
Hmotnost: 160–180 g

Ořešník kropenatý

Nucifraga caryocatactes
Tannenhäher / Spotted Nutcracker



Velikost: 32–35 cm
Rozpětí křídel: 54–58 cm
Hmotnost: 114–226 g

Sojka obecná


Garrulus glandarius
Eichelhäher / Jay



Velikost: 19–22 cm
Rozpětí křídel: 37–42 cm
Hmotnost: 50–90 g

Špaček obecný

Sturnus vulgaris
Star / Starling



Velikost: 54–67 cm
Rozpětí křídel: 115–130 cm
Hmotnost: ♂ samice: 1100–1500 g
♀ samec: 800–1315 g

Krkavec velký


Corvus corax
Kollkräbe / Raven



Velikost: 44–51 cm
Rozpětí křídel: 84–100 cm
Hmotnost: 450–600 g

Vrána černá


Corvus corone
Aaskrähe / Carrion Crow



Velikost: 44–51 cm
Rozpětí křídel: 84–100 cm
Hmotnost: 400–620 g

Vrána šedá

Corvus cornix
Nebelkrähe / Hooded Crow



Velikost: 41–49 cm
Rozpětí křídel: 81–94 cm
Hmotnost: 300–625 g

Havran polní

Corvus frugilegus
Saatkrähe / Rook

Název: Špaček obecný**Třída:** ptáci**Řád:** pěvci**Čeled:** špačkovití**Délka života:** 18 let

Popis: Černě zbarvený pták, jehož peří má kovový, purpurový, modrý až zelenavý lesk. Konce per jsou okrové a bělavé a na těle připomínají skvrny. Po přepelichání v létě jsou skvrny větší. Zobák je žlutý. Mladí ptáci mají hnědou barvu.

Hlas: Pestrá směs skřípavých a hvízdavých tónů. Dokáže imitovat jiné ptáčí druhy.

Potrava: V době hnízdění převažuje živočišná potrava, v létě převažuje potrava rostlinná, především dužnaté plody.

Rozšíření: Tažný druh, který odlétá v průběhu října. Jeho areál zaujímá téměř celou Eurasii s výjimkou severního Ruska, většiny Pyrenejského poloostrova, Itálie a Řecka. Hojnější je v nížinách a pahorkatinách, kde nejraději obývá světlé lesy nebo roztroušenou zeleň poblíž luk nebo pastvin. Častý je v blízkosti lidských sídel.

Hnízdění: Hnízdí od poloviny dubna do června. Mimo dobu hnízdění se ptáci sdružují do hejn. Hnízdo staví oba partneři a je tvořeno větvičkami, slámou a kořínky, vystylají ho jemnou trávou, peřím i různou srstí. Samice klade 4–6 vajec, na kterých sedí 12–13 dní. Po vylíhnutí krmí mláďata oba rodiče 16–24 dní.

Ilustrace: Pavel Procházka**Název: Havran polní****Třída:** ptáci**Řád:** pěvci**Čeled:** krkavcovití**Délka života:** 9 let

Popis: Celý pták má černou barvu. Ve srovnání s vránou má menší hlavu, strmější čelo a užší zobák. V oblasti stehů má tzv. kalhotky, jedná se o prodloužené, načechrané dozadu směřující peří. Ocas je černý se silným kovovým leskem. Starší ptáci mají kůži u kořene zobáku lysou, bělavé barvy. Mladí ptáci jsou zbarveni hnědě bez lesku, kůži u kořene zobáku mají černou a navíc pokrytou peřím.

Hlas: Drsné, nosové a hluché krákání bez hlasitého „r“ jako mají vrány.

Potrava: Živí se hmyzem, drobnými obratlovci, ale také rostlinnou potravou, např. semeny obilovin.

Rozšíření: Populace žijící v ČR jsou převážně tažné a zimují ve Francii. Areál jeho rozšíření zahrnuje Evropu a Asii. Chybí v části Skandinávie, severního Ruska a v jižních částech Evropy. Vyskytuje se v kulturní krajině s remízky a často také v městských parcích převážně v nižších polohách.

Hnízdění: Žije v koloniích. Páry si staví hnízda na vysokých stromech a tvoří je ze suchých větviček zpevněných hlinou, vystylají je trávou a listím. Samice klade 3–5 vajec a sedí na nich 17–20 dní. Po dobu 29–30 dní krmí mláďata oba rodiče.

Ilustrace: Pavel Procházka**Název: Sojka obecná****Třída:** ptáci**Řád:** pěvci**Čeled:** krkavcovití**Délka života:** 13 let

Popis: Tělo má růžově šedohnědě zbarvení, naspodu světlejší. Kostřec má bílý a ocasní pera černá. Zbarvení vyniká především za letu. Po stranách brady má černě zbarvený „vous“. Typická jsou „sojčí pirka“, která mají modrou barvu s příčným černým čárkovaním.

Hlas: Často se ozývá drsným a hlasitým „křiih a mňoukavým „mijé“.

Potrava: Živí se rostlinnou i živočišnou potravou, především hmyzem, vejci a mláďaty ptáků, drobnými hlodavci, žaludy, dužnatými plody, zrním a lískovými ořechy.

Rozšíření: Většinou stálá, sklon k tahu mají mladí ptáci. Její areál zaujímá Eurasii až po Japonsko. Chybí pouze v severní části Skandinávie. Žije v lesích všech typů, přednost dává listnatým a smíšeným lesům.

Hnízdění: Hnízdí na vysokých jehličnatých stromech, jedenkrát do roka. Méně často hnízdí také v rozptýlené zeleni. Hnízdo stavějí obě pohlaví ze stébel bylin a větviček, vnitřek vystylají kořínky. Samice snáší 5–7 vajec, na kterých sedí 16–19 dní. Mláďata krmí oba rodiče 19–21 dní.

Ilustrace: Pavel Procházka**Název: Vrána šedá****Třída:** ptáci**Řád:** pěvci**Čeled:** krkavcovití**Délka života:** 8 let

Popis: Většina těla má šedou barvu. Křídla, hrud' a hlava mají barvu černou. Může se křížít s vránou černou.

Hlas: Krákání podobné vráně černé, ale je méně tvrdé.

Potrava: Živí se rostlinou i živočišnou potravou, především hmyzem, měkkýši, malými savci, vejci a mláďaty ptáků, mršinami, semeny obilovin a dužnatými plody.

Rozšíření: Je to stálý druh se sklony k zimním přeletům. Její areál zaujímá hlavně střední a východní Evropu až po Sibiř. Nejvyšší stavy jsou na východě Evropy. Vyskytuje se hlavně v pahorkatinách v krajině tvořené mozaikou lesů, otevřených ploch a rozptýlené zeleně. Vyhybá se souvislým lesním porostům.

Hnízdění: Při zasnubách se samec a samice dotýkají zobáky. Létají v kruhu a střídají mávavý let s plachtěním. Vytvářejí trvalé páry. Hnízdí jednou ročně a hnízdo staví oba partneři na vysokém stromě. Je tvořeno suchými větvičkami, hlinou a často také hadry a papíry, vystyláno je jemnou trávou, srstí a peřím. Samice klade 4–6 vajec, na kterých sedí 17–20 dní. Mláďata pak oba partneři krmí dalších 30–35 dní.

Ilustrace: Pavel Procházka**Název: Ořešník kropenatý****Třída:** ptáci**Řád:** pěvci**Čeled:** krkavcovití**Délka života:** 11 let

Popis: Zbarvení těla je čokoládově hnědé, hustě skvrněné bílými, ostře ohraničenými kapkovitými skvrnami. Temeno hlavy je tmavohnědé a křídla jsou černohnědá. Ocas je krátký s bílými konci rýdovacích per. Zobák je dlouhý a silný.

Hlas: Ozývá se drsným, hlučným voláním „kerrrrrr“.

Potrava: Živí se převážně rostlinnou potravou, především semeny jehličnatých stromů, ořechy a dužnatými plody. Často si tvoří zásobárny.

Rozšíření: Je to stálý druh. Mimo hnízdění se ptáci potulují až do nižších poloh, kde nalézají více potravy. Vyskytuje se ve všech lesích s převahou smrku. Areál jeho rozšíření zahrnuje většinu Evropy a Asie po Kamčatku a Japonsko.

Hnízdění: Hnízdí především v horských smrkových lesích a také v kulturních smrčinách a smíšených lesích s převahou smrku nižších poloh. Hnízdo staví pár v neprosté většině na smrku blízko kmene a je tvořeno větvičkami, lišejníky, trávou a mechy. Samice snáší 3–5 vajec a sedí na nich 16–18 dní. Mláďata krmí oba rodiče 22–25 dní.

Ilustrace: Pavel Procházka**Název: Vrána černá****Třída:** ptáci**Řád:** pěvci**Čeled:** krkavcovití**Délka života:** 8 let

Popis: Černě zbarvený pták s kovovým leskem. Zobák je černý a silný. Nozdry a kořen zobáku zakrývají štětičková pera. Létá pomalu a plachtí. Může se křížít s vránou šedou.

Hlas: Tvrdé krákání.

Potrava: Živí se rostlinnou i živočišnou potravou, především hmyzem, měkkýši, malými savci, vejci a mláďaty ptáků, mršinami, semeny obilovin a dužnatými plody.

Rozšíření: Stálý druh, někteří jedinci se potulují na krátké vzdálenosti. Její areál je především v západní a střední Evropě a pak až ve východní Asii. Chybí v Irsku, Skotsku a ve Skandinávii. Vyskytuje se hlavně v pahorkatinách v krajině tvořené mozaikou lesů, otevřených ploch a rozptýlené zeleně. Vyhybá se souvislým lesním porostům.

Hnízdění: Vrány vytvářejí trvalé páry. Hnízdí jednou ročně a hnízdo si staví oba partneři na vysokém stromě. Je tvořeno suchými větvičkami, hlinou a často také hadry a papíry, vystyláno je jemnou trávou, srstí a peřím. Samice klade 4–6 vajec, na kterých sedí 17–20 dní. Mláďata pak oba partneři krmí dalších 30–35 dní.

Ilustrace: Pavel Procházka**Název: Straka obecná****Třída:** ptáci**Řád:** pěvci**Čeled:** krkavcovití**Délka života:** 9 let

Popis: Obě pohlaví mají stejné zbarvení Barva je černobílá s dlouhým stupňovitým ocasem. Hlava, hrud, hřbet, ocas a větší část křídel je černě zbarvena. Peří má zelenavý nebo modravý kovový lesk. Břicho a pole ve složeném křídle má bílou barvu. Za letu je nápadná bílý kostřec a bílou vnější částí křídel.

Hlas: Nejčastěji se ozývá rychlým, drsným a řehtavým „re re re re“ nebo kratším „šak šak“.

Potrava: Živí se rostlinou i živočišnou potravou, nejčastěji plody, semeny, hmyzem, plazy, drobnými savci, mršinami, vejci a mláďaty ptáků.

Rozšíření: Je to stálý druh. Její areál rozšíření zaujímá celou Evropu, severní Afriku, velkou část Asie až po Kamčatku a západ Severní Ameriky. Vyskytuje se od nížin až do hor.

Hnízdění: Hnízdí v otevřené krajině s rozptýlenou zelení a poblíž lidských sídel. Staví si velké kulovité hnízdo se stříškou z větviček, které je umístěno v korunách stromů. Některé páry si staví i více hnízd. Samice klade 6–8 vajec a sedí na nich 17–18 dní. Mláďata jsou krmena 22–27 dní a po 6 týdnech se osamostatňují.

Ilustrace: Pavel Procházka**Název: Krkavec velký****Třída:** ptáci**Řád:** pěvci**Čeled:** krkavcovití**Délka života:** 16 let

Popis: Náš největší pěvec. Je to velký statný černý pták s kovovým leskem. Zelený lesk má na hlavě, spodině těla a ocasu, modrý lesk na zádech. Má velmi silný, mohutný a dlouhý zobák. Mladý pták je černohnědý bez lesku.

Hlas: Ozývá se hlasitým „krro krro“.

Potrava: Živí se živočišnou potravou, hlavně mršinami, malými savci, ptáky, vejci, často se živí také odpadky na skládkách, plody a semeny.

Rozšíření: Stálý druh. Jeho areál zaujímá většinu Evropy, Asie, Severní Ameriky a sever Afriky. Vyskytuje se od nižších poloh až do hor, v lesích i v otevřené krajině.

Hnízdění: Je to monogamní druh, který vytváří trvalé páry. Hnízdí jednou do roka. Hnízdo si staví především v korunách vysokých stromů a je tvořeno především z větviček, hlíny, trávy a kořínků, vystylají ho trávou, lišejníky a zvířecí srstí. Samice klade 4–6 vajec, na kterých sedí 18–21 dní. Délka hnízdní péče je 35–49 dní.

Ilustrace: Pavel Procházka