

ŽLUŤÁSEK BORŮVKOVÝ

Samoobslužný pracovní list



Zatrhn rostlinu, na které žije housenka žluťásku borůvkového:



kyhanka sivolistá



vlochyně bahenní



rdesno hadí kořen



Podtrhn správné údaje:

Žluťásek borůvkový žije:

v borových lesích - na horské louce - na horských rašeliništích.

Období letu žluťásku borůvkového začíná:

ve druhé polovině června - koncem dubna - v první polovině srpna.

Tento motýl má rozpětí křídel:

25 až 30 mm - 40 až 50 mm - 50 až 70 mm.

Příčina ohrožení žluťásku borůvkového je:

narušení vodního režimu rašelinišť - kácení lesů - vznik rašelinišť.

Z rašeliniště se tento motýl:

nevzdaluje - vzdaluje jen výjimečně - vzdaluje po vykuklení.

Žluťásek borůvkový má:

2 generace ročně - 5 až 6 generací ročně - 1 generaci ročně.



Přiřaď housenku k motýlovi.



otakárek fenyklový



okáč rudopásný



žluťásek borůvkový



Doplň do křížovky vše, co je na obrázcích.



2




6



5



1



8

1							
2							
	3						
4							
	5						
6							
	7						
8							



3



4



7

