

ŽLUŤÁSEK BORŮVKOVÝ

Samoobslužný pracovní list



Zatrhni rostlinu, na které žije housenka žluťáška borůvkového:



kyhanka sivolistá



vlochně bahenní



rdesno hadí kořen



Podtrhni správné údaje:

Žluťásek borůvkový žije:

v borových lesích - na horské louce - na horských rašeliništích.

Období letu žluťáška borůvkového začíná:

ve druhé polovině června - koncem dubna - v první polovině srpna.

Tento motýl má rozpětí křídel:

25 až 30 mm - 40 až 50 mm - 50 až 70 mm.

Příčina ohrožení žluťáška borůvkového je:

narušení vodního režimu rašelinišť - kácení lesů - vznik rašelinišť.

Z rašeliniště se tento motýl:

nevzdaluje - vzdaluje jen výjimečně - vzdaluje po vykuklení.

Žluťásek borůvkový má:



2 generace ročně - 5 až 6 generací ročně - 1 generaci ročně.



otakárek fenyklový

okáč rudopásný

žluťásek borůvkový



8

1 J E Ž E K

2 J E L E N

3 P U Š T Í K

4 P E R L E Ť O V E C

5 S L I M Á K

6 L A S I C E

7 T E T Ř E V

8 J E Š T Ě R K A

