

Bělásek řeřichový



Proclissiana eunomia
Randring Perlmutterfalter
Bog Fritillary

Rozpětí křídel: 35–44 mm
Délka předního křídla: 15–18 mm

Název: Bělásek řeřichový

Třída: hmyz **Řád:** motýli **Čeleď:** běláskovití

Potrava: Dospělci – nektar různých druhů rostlin. Housenka – řeřišnice luční, barborka obecná, česnáček lékařský, strnoblýl a jiné brukvovité rostliny.

Biotop: nivní louky, květnaté okraje lesů, mezi stromy podél vodních toků.

Mláďata: Samičky kladou vajíčka jednotlivě (díky kanibalismu larev) na mladé živné rostliny. Aby na jednu rostlinu nenakladly samice více vajíček, je vajíčko výstražně oranžově zbarveno. Vývoj zelené housenky s bělavým páskem proběhne rychle a po zakuklení přezimuje.

Popis: Motýl se líhne na konci dubna a je ozdobou každé vlhké šumavské louky. Samečci se od samic výrazně liší tím, že mají nahoře na předních křídlech oranžovou skvrnu. Samičky jsou černobílé. Motýli poletují především v blízkosti svých živných rostlin (nejčastěji řeřišnice luční). Jsou k vidění všude tam, kde naleznou na jaře v květech dostatek potravy, ale hlavně na osluněných místech.