



**Velikost:** 1–4 m

**Doba květu:** IV–V

## **Bez červený**

*Sambucus racemosa*

*Red-berried Elder / Trauben-Holunder*

**Název:** Bez červený

**Třída:** dvouděložné

**Řád:** štětkotvaré

**Čeled:** pižmovkovité

**Biotop:** Roste v listnatých i jehličnatých lesích, ale také v roklinách a na pasekách. Velmi dobře snáší zastínění a je náročný na dostatek vláhy. Vyhovují mu kyselé až neutrální humózní půdy bohaté na živiny. Je odolný vůči mrazu. Může být rozšiřován ptactvem.

**Popis:** Keř má metlovitý vzrůst a ve spodní části prutové výhonky. Na borce, která má hnědou barvu, jsou výrazné lenticely. Dřeň je skořicově hnědá, na rozdíl od bezu černého, který má bílou dřeň. Listy jsou lichozpeřené, čepel listů je dlouhá 10–12 cm. Jednotlivé lístky jsou pilovité, eliptického tvaru. Latovité květenství je zbarveno žlutě. Plody mají červenou barvu a ve větším množství jsou mírně jedovaté.

**Rozšíření:** Je rozšířen především ve střední Evropě a na severu jižní Evropy. Na východě zasahuje až na Dálný východ a nechybí ani v Severní Americe. V ČR se vyskytuje od pahorkatin až do hor.

**Ilustrace:** Pavel Procházka