



Velikost: 15–60 cm

Doba květu: IV–VI



Brusnice borůvka

Vaccinium myrtillus

Bilberry / Heidelbeere

Název: Brusnice borůvka

Třída: dvouděložné

Řád: vřesovcotvaré

Čeleď: vřesovcovité

Biotop: Roste v rozlehlých porostech na kyselých, živinami chudých půdách. Typický druh rašelinišť, vřesovišť, pastvin a lesních pasek borových a smrkových lesů.

Popis: Hustě rozvětvený keřík s listy, které na podzim opadávají. Listy jsou vejčité, na okrajích zoubkaté, dlouhé 1–2 cm a mají světle zelenou barvu, na lodyze jsou uspořádány střídavě. Květy, které jsou umístěny jednotlivě v paždí listů ve vrcholcích větví, mají nazeleňalou nebo načervenalou barvu. Koruna je kulovitě baňkovitého tvaru. Plodem jsou černomodré bobule s modrofialovou dužninou, které jsou jedlé a objevují se v červenci až srpnu. Plody obsahují vitamin A a C. Jsou známé svými léčivými účinky, především při léčbě cukrovky, ale i dalších onemocnění.

Rozšíření: Roste v celé Evropě, ve Středomoří pouze v horách. Přesahuje do Asie, na Kavkaz, do Mongolska a na Sibiř. V ČR rozšířená na celém území. Nejhojnější je v horách, v nižších polohách je vzácnější.

Ilustrace: Pavel Procházka