



**Velikost:** 10–30 cm  
**Doba květu:** V–VII

## **Brusnice brusinka**

*Vaccinium vitis-idaea*  
Cowberry / Preiselbeere

**Název:** Brusnice brusinka

**Třída:** dvouděložné

**Řád:** vřesovcotvaré

**Čeleď:** vřesovcovité

**Biotop:** Nejvíce jí vyhovují kyselé, na živiny chudé, půdy vřesovišť a rašelinišť. Častá je ve světlých smrkových a borových lesích středních a vyšších poloh. Roste také na písčitých půdách a skalách.

**Popis:** Plazivý keřík se zdřevnatělým stonkem a rozvětveným oddenkem. Tuhé listy mají na svrchní straně tmavě zelenou barvu a neopadávají. Spodní strana listů je světle zelená. Délka listů je 1–2 cm. Květy jsou sdruženy v převislých jednostranných hroznech na krátkých stopkách po 3–8. Barva květů je bílá s růžovým nádechem. Plodem je bobule červené barvy, která má kysele nahořklou chuť a která dozrává v srpnu až říjnu. Brusinka je významná svými léčivými účinky při problémech s močovými cestami a obsahuje vitamin C.

**Rozšíření:** Roste v celé Evropě s výjimkou Středomoří a ve velké části Asie. V ČR je nejhojnější v horských polohách, ve středních polohách je její výskyt roztroušený a v nižších polohách vzácný.

**Ilustrace:** Pavel Procházka