



**Velikost:** Délka ulity je 4,5 až 9 mm, šířka 3,4 až 6,8 mm, výška 1,8 až 5 mm

## **Kamomil říční**

*Ancylus fluviatilis*

*Flussnapschnecke / River Limpet*



NP a CHKO Šumava  
Střediska environmentální  
výchovy

**Název:** Kamomil říční

**Třída:** plži

**Řád:** plicnatí

**Čeled:** okružákovití

**Délka života:** 1–2 roky

**Popis:** Žije přisedle na kamenech, ulita netvoří závit, ale tupý, doprava a dozadu pootočený vrchol, je křehká, téměř průsvitná s paprscitým rýhováním. Zbarvení je rudohnědé, hnědé, žlutavé a někdy šedobílé. Je to hermafrodit, vajíčka snáší v kruhových kokonech. K líhnutí dochází za 3–4 týdny. V létě žije na vrchní straně kamenů, kde nalézá více potravy, zimu tráví na jejich spodní straně. Sám je často potravou ryb.

**Potrava:** Tvoří ji zelené řasy a rozsivky uchycené na kamenech. K rozmělnění potravy polyká zrnka písku.

**Biotop:** Vyskytuje se převážně v rychle tekoucích vodách bohatých na kyslík a v prameništích.

**Výskyt:** V ČR se vyskytuje na celém území v rychle tekoucích vodách. Dříve býval hojný, ale následkem znečištění vod jeho stavy klesají. Obývá větší část Evropy, Alžírsko a Zakavkazí. Na Šumavě byl zjištěn v údolí Pstružného potoka a v PR Amálino údolí.

**Zajímavost:** Někdy bývá mezihostitelem parazitů, nejčastěji motolic.

**Ilustrace:** Pavel Procházka