



**Velikost:** 28–32 cm

**Rozpětí křídel:** 43–48 cm

**Hmotnost:** 330–475 g

## **Koroptev polní**

*Perdix perdix*

*Rebhuhn / Gray Partridge*

**Název:** Koroptev polní

**Třída:** ptáci

**Řád:** hrabaví

**Čeleď:** bažantovití

**Délka života:** 2–3 roky

**Popis:** Tělo je šedohnědě zbarveno. Čelo, nadoční proužek, tváře, hrdlo a ocasní péra má zbarvené rezavě. Křídla mají hnědou barvu s podélnými proužky bílé barvy. Samce od samice poznáme podle hnědé podkovovité skvrny na rozhraní hrudi a břicha, která je u samce větší.

**Hlas:** Ozývá se tóny „čičik čičik“.

**Potrava:** U dospělých jedinců převažuje rostlinná potrava (semena plevelů, obiloviny), mláďata se živí především drobným hmyzem.

**Rozšíření:** Je stálá. Vyskytuje se v zemědělské mozaikovitě krajině. Areál rozšíření zahrnuje celou Evropu a v Asii dosahuje až do Mongolska. V ČR se vyskytuje hojněji v nižších polohách. Na Šumavě a jejím podhůří je výskyt koroptve vzácný.

**Hnízdění:** Žije monogamně v trvalých párech. Hnízdí v polích, mezích, v zaplevelených plochách a dalších místech v otevřené krajině. Hnízdo staví samice a snáší do něj 10–20 vajec. Na vejcích sedí samice sama 23–25 dnů. Mláďata hned po oschnutí opouštějí hnízdo, v tomto období jsou velmi citlivá především na chladné a deštivé počasí. Hnízdění probíhá jednou ročně.

**Ilustrace:** Pavel Procházka