



Velikost: 12–20 mm

Kozlíček dazule

Acanthocinus aedilis

Timberman / Zimmermannsbock

Název: Kozlíček dazule

Třída: hmyz

Řád: brouci

Čeleď: tesaříkovití

Délka života: 1–2 roky

Popis: Má nejdelší tykadla z našich brouků, u samce jsou tykadla 3 až 5krát delší než tělo. Samice má tykadla 1,5krát delší než tělo a na zadečku nezatažitelné kladélko.

Vývoj: Dospělce lze vidět od března a patří k nejčasnějším broukům. Je aktivní především v noci, kdy opouští úkryt ve štěrbinách kůry. Je nevýrazně, maskovaně zbarvený a na kmenech stromů není téměř vidět. Samice klade za život kolem 30–50 vajíček, která pomocí kladélka umisťuje do pařezů nebo padlých kmenů se silnou kůrou. Larva se vyvíjí pod kůrou, kde se později zakuklí a jako kukla také přezimuje. Obvod kukelné kolébky je obložen třískami. Mladí brouci se líhnou tentýž rok na konci léta a na podzim a přezimují pod kůrou.

Potrava: Jedná se o býložravý druh, larva se živí dřevem.

Výskyt: Nejčastěji na borovici, občas také na smrku, jedli a modřínu. Vyskytuje se v severní části palearktické oblasti.

Ilustrace: Pavel Procházka