

Křivka obecná



Loxia curvirostra
Fichtenkreuzschnabel
Crossbill

Velikost: 15–17 cm
Rozpětí křídel: 92–101 mm

Název: Křivka obecná

Třída: ptáci **Řád:** pěvci **Čeled:** pěnkavovití

Délka života: 13 let (údaj ČR)

Mláďata: Samička snáší zpravidla 3–4 vejce, sedí na nich 12–15 dní. Mláďata jsou krmena rodiči 15–20 dní. Po opuštění hnízda zůstávají s rodiči a vytvářejí hejna.

Hlas: Častým vábením je typické hlasité „gip gip“. Zpěv je hlasitý pomalu přednášený, dost variabilní.

Hnízdo: Staví si silnostěnné hnízdo s hlubokou kotlinkou z větviček, mechu a lišejníků ve vrcholcích vysokých smrků.

Potrava: Především semena smrku, která vytahuje ze šišek k tomu uzpůsobeným silným překříženým zobákem. Potravu tvoří ale i květy a pupeny různých listnáčů. Dále hmyz, především housenky a mšice.

Popis: Velice společenský pták vyskytující se v malých či větších skupinách. Ptáci šplhají velice obratně ve větvích a rozebírají šišky smrků. Dospělí samci mají hlavu, hřbet a prsa cihlově červená. Samice jsou převážně žlutozelené nebo šedozelené. Podíl červeného zbarvení samců není odvislý od věku. Pelichají-li samečci (mladí i staří) do července, mají žluté zbarvení, pokud později, jsou zbarveni do červena.

Výskyt: Hnízdí ve smrkových lesích. Na Šumavě je celoplošně rozšířeným druhem. Vyskytuje se i ve smrkových lesích v nejvyšších horských polohách Šumavy.

Ilustrace: Pavel Procházka