



Velikost: 4,5–5,2 cm
Silně ohrožený druh

Kuňka žlutobřichá

Bombina variegata

Gelbbauchunke / Yellow-bellied Toad

Název: Kuňka žlutobřichá

Třída: obojživelníci

Řád: žáby

Čeled: kuňkovití

Délka života: Nejvyšší známý věk je 15 let.

Chování: Denní až soumravná aktivita. Zimuje na souši, v mokřadech, v děrách, štěrbinách a pod kmene stromů. Při obraně vypouští kožní, intenzívně páchnoucí sekret.

Hlasové projevy: Ozývá se kňučivým „u-u-u-u“.

Rozmnožování: Samička přichycuje vajíčka po 2–30 kusech na vodní rostliny nebo na předměty v mělké vodě. Pářit se může třikrát a celkem naklade za sezonu až 170 vajíček.

Potrava: Červi, larvy komárů a drobní bezobratlí živočichové.

Popis: Hlava i tělo jsou zploštělé, zornice srdcovitého či trojúhelníkovitého tvaru. Zbarvení šedé, olivově zelené nebo hnědé, břicho je žluté s černými skvrnami. Kůže je bradavičnatá.

Výskyt: Převážně podhorský až horský druh. Vyhledává mokřady, osluněné mělké kaluže a nádrže, ale vyskytuje se také v lesních oblastech. V ČR je rozšířena ostrůvkovitě, hojnější a souvislejší výskyt je jen v karpatském systému a jeho podhůří. Na Šumavě se jedná o ojedinělý výskyt v okrajových částech, SZ okraj CHKO a na území VVP Boletice.

Ilustrace: Pavel Procházka