



Velikost: 50–150 cm

Doba květu: III–IV

Lýkovec jedovatý

Daphne mezereum

Mezereon / Gewöhnlicher Seidelbast

Název: Lýkovec jedovatý

Třída: dvouděložné

Řád: slézotvaré

Čeleď: vrabečnicovité

Biotop: Roste ve světlých smíšených lesích a na lesních okrajích. Vyhledává vlhké hlinité půdy bohaté na humus, náročný je také na vzdušnou vlhkost.

Popis: Mělce kořenící keř s vystoupavými šedohnědými chlupatými větvemi, které postupem času olýsávají. Podlouhlé kopinaté listy jsou umístěny střídavě a často jsou nahloucheny na konci větví. Kvete brzy zjara ještě před rozvinutím listů a květy jsou stejně jako listy umístěny na koncových částech větví. Růžové květy trubkovitého tvaru nápadně a silně voní. Plodem je červeně zbarvená dužnatá peckovice kulovitěho tvaru. Celá rostlina je jedovatá, smrtelná dávka pro dospělého člověka je 10–12 bobulí.

Rozšíření: Roste téměř v celé Evropě, na Sibiři, Kavkaze a v Malé Asii. V ČR je nejhojnější v pahorkatinách a vrchovinách. Na Šumavě je rozšířen roztroušeně od podhůří do vyšších poloh.

Ilustrace: Pavel Procházka