

Mlok skvrnitý



Salamandra atra
Feuersalamander
Fire Salamander

Velikost: 15–28 cm
Silně ohrožený druh

Název: Mlok skvrnitý

Třída: obojživelníci **Řád:** ocasatí **Čeleď:** mlokovití

Délka života: 20 let (v zajetí až 40 let)

Mláďata: Páření mloků probíhá v létě a na podzim, vajíčka oplozená spermii se vyvíjejí v těle samice, a ta teprve třetím rokem rodí koncem dubna až června v čisté vodě přibližně 20–30, někdy však až 70 larev o délce 2,2–3,6 cm. K proměně u nich dochází po třech měsících – v srpnu až září, kdy průměrně 5–6,5 cm veliká mláďata opouští vodní prostředí.

Potrava: Ve všech fázích vývoje mloka tvoří jeho potravu pouze živočišná složka. Larvy se živí vodními bezobratlými, rybím potěrem, drobnými korýši nebo členovci. Dospělci se živí nejčastěji malými až středně velkými bezobratlými, jako jsou plži, červi, žížaly, stonožky, pavouci a drobný hmyz.

Popis: Žije nočním způsobem života, přes den se ukrývá před přímým slunečním zářením. Ve dne své úkryty opouští jen za deště nebo po dešti. Na přelomu října a listopadu se schovává do podzemí, kde je přibližně stálá teplota.

Výskyt: Mlok skvrnitý obývá vlhké lokality listnatých a smíšených lesů s přítomností drobných vodních toků, potůčků, pramenů, jezírek nebo studánek. Vyskytuje se od nížin do hor, u nás vystupuje až do 1000 m n. m. Díky svému jedu, který je vyměšován kožními žlázami, nemá téměř žádného přirozeného nepřítele.

Ilustrace: Pavel Procházka