

Modrásek očkovaný



Phengaris teleius
Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling
Scarce Large Blue

Rozpětí křídel: 34–38 mm
Délka předního křídla:
16–18 mm
Silně ohrožený druh

Název: Modrásek očkovaný

Třída: hmyz **Řád:** motýli **Čeleď:** modráskovití

Potrava: Pouze krvavec toten.

Mláděta: Samice klade vajíčka jednotlivě na nerozvinuté květní hlávky živné rostliny. Housenky se v květech dlouho nezdržují a po několika týdnech jsou odnášeny do mravenišť, kde jsou krmeny mravenci a dokončují svůj vývoj. Housenky v mravenišťích přezimují a nakonec se tam i kuklí. V jednom mraveništi dokončí svůj vývoj jen několik housenek. Vztahu s mravenci se říká myrmekofilie.

Popis: Tento motýl létá od července až do druhé poloviny srpna na typu luk pojmenovaných podle živné rostliny – „totenové louky“. Modrásek očkovaný je ekologicky velmi podobný příbuznému modrásku bahennímu (*Phengaris nausithous*), se kterým se na řadě lokalit vyskytuje společně. Modrásek očkovaný má však vyhraněnější nároky na stanoviště. Jeho výskyt je spíše jednotlivý a je tedy vzácnější.

Výskyt: Obývá extenzivně obhospodařované louky se zachovalým vodním režimem a žije pouze na místech s výskytem krvavce totenu. Velice významnými místy jsou sušší louky s krvavcem, např. pod obcemi Chlum u Volar, Pěkná nebo Želnavá. Okolo Lipna preferuje vlhké louky.

Ilustrace: Pavel Procházka