

# Můra vlochyňová



*Anarta cordigera*  
*Moor-Bunteule*  
*Small Dark Yellow Underwing*

**Rozpětí křídel:** 38–42 mm  
**Délka předního křídla:** 21–26 mm

# Název: Můra vlochyňová

**Třída:** hmyz **Řád:** motýli **Čeleď:** můrovití

**Mládka:** Vajíčka klade na listy vlochyňe. Vajíčka jsou žlutobílá, bochníkovitá, žebírkatá. Jsou kladena na rub listů jednotlivě. Housenka se vyvíjí od června do srpna. Ke kuklení si zhotoví na zemi v mechu komůrku, ve které červenohnědá kukla přečkává až do příštího jara.

**Potrava:** Dospělec – nektar kvetoucího rojovníku bahenního a kvetoucí brusnice, housenka – vlochyňe, medvědice.

**Popis:** Motýli často létají před západem slunce klikatým letem nízko nad zemí. Za špatného počasí sedí na kmelech a větvích jehličnanů. Tento druh je zřejmě pozůstatkem doby ledové. Motýli létají jen za slunečního svitu. Za podmračeného počasí a v noci sedí na větvích a kmíncích kleče a smrků a při otřesu padají na zem a ani se nesnaží odletět. Housenka je aktivní v noci, ve dne je skryta mezi listy rostlin. Housenky reagují na vlastnosti ovzduší tím, že se na stoncích a větévkách rostlin stěhují směrem nahoru nebo dolů.

**Výskyt:** Vzácny podhorský a horský druh rašelinišť a podmáčených lesů.