



Velikost: 37–50 mm

Okáč ječmínkový

Lasiommata maera

Rispensfalter / Large Wall Brown



Název: Okáč ječmínkový

Třída: hmyz

Řád: motýli

Čeleď: babočkovití

Housenka: Housenka má před zakuklením délku 30 mm. Barvu má modrozelenou s několika bílými podélnými pruhy. Hlava je malá a má zelenou barvu.

Dospělec: Sameček je hnědě zbarvený, v rohu na předních křídlech má umístěné černé oko s bílým středem na oranžovém podkladě. Na zadních křídlech má tři očka podobné barvy. Samička je o něco větší s výraznějšími a většími oky.

Stanoviště: Vyskytuje se na travnatých místech, lesních loučkách, pasekách a mezích. V horách má jednu generaci do roka a v nižších polohách dvě.

Hostitelské rostliny: Vývoj probíhá na různých druzích trav.

Zimování: Zimuje jako housenka v posledním stádiu před zakuklením. K zakuklení dochází na jaře.

Rozšíření: Vyskytuje se v Evropě, severní Africe a v Asii až po Himaláje. Chybí na britských ostrovech. Na Šumavě a v šumavském podhůří se jedná o hojný druh.

Ilustrace: Pavel Procházka