

Okáč rudopásný



Erebia euryale
Weissbindiger Bergwald-Mohrenfalter
Large Ringlet

Rozpětí křídel: 34–46 mm
Délka předního křídla:
20–23 mm
Druh není ohrožen

Název: Okáč rudopásný

Třída: hmyz **Řád:** motýli **Čeleď:** okáčovití

Mláděta: Samička klade vajíčka jednotlivě na konce listů trav. Přezimují jako housenka.

Potrava: Na Šumavě tenkolisté druhy horských trav jako např. kostřava či smilka. Housenka se ale ve střední Evropě živí nejčastěji pšeničkem rozkladitým. Kukla leží volně na zemi.

Popis: Jde o nápadného a v sudých letech hojného motýla. Na líci křídel je motýl tmavě hnědý s rudohnědou příčnou páskou, ve které jsou umístěna tři černá očka. Na rubu křídel je motýl velmi proměnlivý. Motýli létají od července do srpna. Nejvíce jich spatříme po okrajích cest, rašeliništ, luk a pastvin nebo podél břehů potoků a na pasekách, jak sají nektar z květů starčeků nebo bodláků. Na jediné květenství starčku se může slétnout i více než desítka motýlů.

Výskyt: Je velmi hojný v nadmořské výšce nad 1 000 metrů. Je to horský druh a patří k typickým druhům horského smrkového pásma. Potřebuje také rozvolněné lesy a lemy cest, podél kterých hledá kvetoucí rostliny. Pro Šumavu je typickým motýlem, zvláště v suchých letech, především v nejbližším okolí Kvildy, Srní, Prášil nebo jezera Laka. K vidění je také v hluboce zaříznutých údolích (Vydra) nebo na hřebenech (Poledník).

Ilustrace: Pavel Procházka