

# Osenice rašelinná



*Coenophila subrosea*  
Eulenfalter  
*Rosy Marsh Moth*

**Velikost:** 36–42 mm  
**Zranitelný druh**

# Název: Osenice rašelinná

**Třída:** hmyz **Řád:** motýli **Čeleď:** můrovití

**Potrava:** Housenky se živí převážně rašelinnými rostlinami. Nejčastěji vyhledávají vlochyňi, vřes, kyhanku či rojovník bahenní.

**Mláděta:** Samičky kladou vajíčka jednotlivě nebo v málo početných snůškách a z vajíček se po 2–3 týdnech líhnou housenky dlouhé asi 2 mm, které jsou aktivní především v noci. Ve stádiu housenky pak přečkávají zimu. Na jaře pokračují ve vývoji. V červnu dosahují velikosti asi 30 mm, mají tmavší skvrny a hnědorůžovou hlavu. Kuklí se na zemi, v komůrce zhotovené z mechu nebo opadanky.

**Popis:** Osenice rašelinná patří k význačným druhům Šumavy. Tato můra má jemná široká křídla, kdy zbarvení může být velice proměnlivé. Přední křídla mohou být šedohnědá, červenavá až modrošedá. Samička a sameček mají odlišná tykadla, sameček je má hřebenitá a samička nitkovitá. Motýl létá výhradně v noci.

**Výskyt:** Osenice je velice úzce vázána na otevřené rašelinné plochy. Hlavním místem výskytu tohoto druhu je Mrtvý luh a další hornovltavská rašeliníště. Mimořádně vzácná je v blízkosti Borových Lad.