



Velikost: 34–40 mm
Kriticky ohrožený druh

Perleťovec severní

Boloria aquilonaris

Hochmoor-Perlmutterfalter /Cranberry Fritillary



NP a CHKO Šumava
Střediska environmentální
výchovy

Název: Perleťovec severní

Třída: hmyz

Řád: motýli

Čeleď: babočkovití

Housenka: Dorostlá housenka má délku 30 mm, má žlutohnědou barvu a celé její tělo pokrývají rozvětvené trny.

Dospělec: Dospělec se líhne v červnu až červenci. Motýl má líc křídel zbarvený červenohnědě s černými skvrnami, jejich rub je hnědý s příčnou páskou žluté barvy a na okraji zadního křídla tvoří souvislou řadu bělavé skvrnky. Aktivita je denní.

Potrava: Dospělec saje nektar na kvetoucích rašeliništních rostlinách. Housenka se živí na klikvě bahenní.

Stanoviště: Vázaný pouze na rašeliniště a jejich okraje.

Hostitelské rostliny: Vývoj probíhá na klikvě bahenní.

Zimování: Tento druh přezimuje v prvním vývojovém stupni housenky, kdy je ještě velmi malá, proto jí jako úkryt slouží dutina stélky rašeliníku.

Rozšíření: Areál výskytu je eurosibiřský se souvislým rozšířením od střední Evropy na sever do Skandinávie a na východ na Sibiř a Kamčatku. Výjimku tvoří dvě oblasti ve Francii a ve Švýcarsku.

Ilustrace: Pavel Procházka