



Velikost: 12–16 mm

Roháček bukový

Sinodendron cylindricum

Horned stag beetle / Kopfhornschröter

Název: Roháček bukový

Třída: hmyz

Řád: brouci

Čeleď: roháčovití

Popis: U samců je typický ochlupený roh, který je dozadu zahnutý a vyrůstá na hlavě, samička má na hlavě pouze malý hrbolek. V přední části štítu má samec malou prohlubeň ohraničenou pěti výrůstky. Samička má v přední části štítu pouze slabý vtisk.

Vývoj: Objevuje se v červnu až červenci. Vyhledává staré tlející stromy a pařezy. Larvy se vyvíjejí ve dřevě, ve kterém vykusují chodbu, kterou vyplňují drtí a exkrementy. Larva se kuklí v kukelné kolébce, kterou si na konci svého vývoje vykouše ve dřevě. Brouk, který se vylíhne na podzim, v kolébce přezimuje a opouští ji až v létě dalšího roku. Může však přezimovat v různých vývojových stádiích.

Potrava: Býložravý druh, larva se živí dřevem.

Výskyt: Především v listnatých lesích s převahou buku. Občas jej lze nalézt také v jilmu, javoru, dubu nebo starých ovocných dřevinách. Vyskytuje se ve velké části Evropy i daleko na sever.

Ilustrace: Pavel Procházka