



Šířka klobouku: 5–30 cm

Výška klobouku: 1–4 cm

Jedlá houba

Sírovec žlutooranžový

Laetiporus sulphureus

Chicken of the Woods / Schwefelporling

Název: Sírovec žlutooranžový

Říše: houby

Třída: stopkovýtrusé

Řád: chorošotvaré

Čeled: troudnatcovité

Výskyt: Roste hojně od května do září na živých i odumřelých listnatých stromech, především na třešních a topolech.

Popis: Klobouk má polokruhovitý, vějířovitý až konzolovitý tvar a je bokem přirostlý k hostitelské dřevině. Na povrchu je vrásčitý a ojíňený. Barva klobouku je v mládí žlutá až žlutooranžová, ve stáří okrově žlutá až bíložlutá. Dužnina mladých plodnic je aromatická, měkká a šťavnatá, u starých plodnic je tvrdá drobivá a lámavá. Výtrusný prach je zbarven bíle až nažloutle. Trsovitě plodnice rostou střežovitě nad sebou. Mladé plodnice jsou jedlé, mají výraznou houbovou vůni a nakyslou chuť. Způsobuje hnědou hnilobu dřeva. Na jehličnanech ve vyšších polohách roste podobný, ale vzácný sírovec horský.

Rozšíření: Roste od nížin až do hor téměř na celé severní polokouli.

Ilustrace: Pavel Procházka