

Srnec obecný



Capreolus capreolus
Reh
European Roe Deer

Velikost: v kohoutku 65–75 cm
délka ocasu 2–3 cm
Hmotnost: 15–20 kg

Název: Srnec obecný

Třída: savci **Řád:** sudokopytníci **Čeled:** jelenovití

Mláděta: V polovině července začínají samci bojovat o přízeň samic. Do listopadu se zárodek prakticky nevyvíjí (latentní březost). V květnu až červnu rodí srna obvykle jedno, někdy dvě hnědá, bíle skvrnitá mláděta (srnčata).

Délka života: Ve volné přírodě se dožívá max. 10 let. Po-trava: Nejrůznější byliny, občas také různé plody. Popis: Srst srnce obecného má rezavo-červený odstín, na zimu narůstá srst, která je daleko tmavší. Samci mají parůžky, které mohou dorůst až do délky 25 cm. Od října až do prosince srnci parůžky shazují, na jaře příštího roku jim narůstají nové, které jsou zpočátku pokryté sametovou vrstvou, která se nazývá lýčí a vyživuje parůžek při vývoji a růstu. Po dokončení vývoje parůžků srnec vytlouká – zbavuje parůžky odumřelého lýčí otíráním o slabé kmínky stromů. Srncí paroží může být zašpičatělé, ale může mít i 4–6 výsad. Podle počtu výsad se jedná o špičáka, vidláka, šesteráka a výjimečně osmeráka (čtyři výsady na jednom parůžku). Srnec obecný je relativně plachý, často se ozývá zvukem podobným psímu štěknutí. V období nouze se srncí zvěř sdružuje do stád.

Rozšíření: Obývá prakticky celou Evropu. V České republice se jedná o nejhojnějšího sudokopytníka.