



Velikost: 15–60 cm

Doba květu: VI–VIII

Štírovník růžkatý

Lotus corniculatus

Gewöhnlicher Hornklee / Common Bird's-foot-trefoil



NP a CHKO Šumava
Střediska environmentální
výchovy

Název: Štírovník růžkatý

Třída: vyšší dvouděložné

Řád: bobotvaré

Čeled: bobovité

Biotop: Roste na sušších loukách, pastvinách, mezích, ale také ve světlých lesích. Není náročný na vlhkost ani kvalitu půd, vyhýbá se pouze silně zasoleným půdám.

Popis: Vytrvalá bylina se silným až 1 m dlouhým křovitým kořenem a poléhavou hranatou lodyhou. Listy jsou složeny z pěti lístků, sytě zelené barvy, dolní pár lístků je přisedlý ke stonku. Palisty u dospělých rostlin chybí. Květy jsou žluté až oranžové, nahloučené po 3–7. Plodem je lusk hnědé až šedé barvy o velikosti 2–4 cm, který obsahuje 8–20 hnědošedých semen. Je významnou medonosnou rostlinou. Živí se jím housenky vřetenušky obecné a vřetenušky pětitečné.

Rozšíření: Jeho areálem je Evropa a západ Asie. V Evropě se vyskytuje i v lokalitách přesahujících 3000 m n. m. V ČR se jedná o běžný druh od nížin do hor.

Ilustrace: Pavel Procházka