



Šířka klobouku: 8–50 cm

Výška klobouku: 5–20 cm

Troudnatec kopytovitý

Fomes fomentarius

Touchwood Fungus / Zunderschwamm

Název: Troudnatec kopytovitý

Říše: houby

Třída: stopkovýtrusé

Řád: chorošotvaré

Čeled: chorošovité

Výskyt: Roste hojně na odumřelých i živých listnatých stromech, především bucích, ale také na břízách, dubech a javorech.

Popis: Klobouky mají kopytovitý a později polokruhovitý tvar a na povrchu tvrdou kůru, přirůstáním tvoří charakteristické vrstvy. Klobouk je na povrchu v mládí hnědě zbarvený a později šedohnědý až šedý. Dužnina klobouku tmavě rezavě hnědě zbarvená, vrstevnatá, vláknitá a dřevnatě tvrdá. Výtrusný prach je bíle zbarvený. Plodnice jsou víceleté, bokem přirostlé ke dřevu a každoročně přirůstají. Způsobuje velmi rychlou a destruktivní bílou hnilobu. Houba se dříve používala na zastavení krvácení.

Rozšíření: Vyskytuje se od nížin až do hor. Nejvhodnější podmínky nachází v pahorkatinách. Roste v Severní Americe, na severu Afriky, v Asii, Japonsku a v celé Evropě. Ve střední Evropě roste hlavně na buku, v severní Evropě na břízách a v jižních částech Evropy na topolech.

Ilustrace: Pavel Procházka