



**Velikost:** 5–25 cm  
**Doba květu:** VI–VII  
**Silně ohrožený druh**

## **Tučnice obecná**

*Pinguicula vulgaris*

*Echtes Fettkraut / Common Butterwort*



NP a CHKO Šumava  
Střediska environmentální  
výchovy

**Název:** Tučnice obecná

**Třída:** dvouděložné

**Řád:** hluchavkotvaré

**Čeled:** bublinatkovité

**Biotop:** Vyhledává vlhká a podmáčená stanoviště, především rašelinné louky a prameniště.

**Popis:** Masožravá rostlina s celokrajnými listy v přízemní růžici. Listy jsou hustě pokryty masitými žlázkami, které vylučují trávicí enzymy, s jejichž pomocí rostlina rozloží lapený hmyz. Hmyz je během 1–3 dnů rozpuštěn a vstřebán, zbyde pouze chitinová vrstva. Vodu a část minerálních látek přijímá spodní plochou lapacích listů. Květy jsou tmavě modrofialové. Jejím plodem je podlouhle vejčitá tobolka.

**Rozšíření:** Vyskytuje se v Evropě, ale také v Severní Americe. V jižních oblastech rozšíření sahá její výskyt hlavně do horských poloh. Na Šumavě roste roztroušeně po celém území, ale v Bavorsku a v Rakousku je vzácnější než v ČR.

**Ilustrace:** Pavel Procházka