

# Zajíc polní



*Lepus europaeus*  
*Feldhase*  
*Brown Hare*

**Velikost:** délka těla 55–60 cm  
Délka ocasu 7,5–10 cm  
**Hmotnost:** 2,5–7 kg

# Název: Zajíc polní

**Třída:** savci **Řád:** zajíci **Čeleď:** zajícovití

**Mláděta:** Samice mívá 2–3 vrhy s 2–5 mláděty, která přicházejí na svět osrstěná a vidoucí. U samice se drží pouze 2–3 dny, poté se 3 týdny vracejí pouze na kojení. Zvláštností u zajíce je opětovné oplození v době březosti (tzv. superfetace).

**Délka života:** 8–12 let

**Potrava:** Výlučně rostlinná potrava podle celoroční nabídky. V zimě okusuje letorosty a ohryzává kůru listnatých dřevin, příležitostně konzumuje různé dužnaté plody a semena. Zpravidla vystačí s vodou obsaženou v přijímané potravě.

**Popis:** Zajíc polní má protáhlé tělo, oválnou hlavu s nápadně dlouhými ušními boltci. Zadní končetiny jsou podstatně delší než přední. Srst je skořicově hnědá, boky jsou světle hnědé a břicho téměř bílé. Tmavá je také svrchní strana krátkého ocasu. Zajíc žije samotářským způsobem života, pouze v době páření je možné spatřit více jedinců pohromadě. Obvykle přes den odpočívá a teprve se soumrakem vychází z úkrytu.

**Rozšíření:** Je rozšířený na celém území ČR. Zdržuje se na polích, loukách, úhorech, mezích, stráních a větrolamech, případně sadech. Vyhovují mu také okraje lesů, vyskytuje se až po horní hranici lesa, a to i uprostřed velkých lesních celků, jako je Šumava.

**Ilustrace:** Pavel Procházka